

Ärtsorterna

Ärternas officiella sortförsök 2012--2019. Sorterna i tidighetsordning. Rokka är försökens mätarsort.

Sort	Ägare	I sort-förteckningen	Rekommenderad odlingszon	Växttid	Effektiv värmesumma	Skörd			Protein-skörd	Liggsäd	Stjälklängd	Ärtans färg	Tkv	Protein	Blomnings-tid	Mognad *)	Felfria
						Odlingszon											
				dygn	grader Celsius	I	II	III	kg/ha	%	cm	gram	%	%	%		
Rokka	SW Lantm.	2005	I-III/e	97	1074	2703=92	3762=98	4386=107	675	27	66	grön	292	23,4	12	99	85
Karita	SW Lantm.	1995	I-III/e	98	1085	100	100	100	655	30	69	grön	297	22,6	12	98	85
Martti	Bor	2020	I-III/e	98	1083	114	126	118	851	21	84	grön	270	24,1	16	98	84
Jymy	Bor	2012	I-III/e	101	1112	96	115	112	757	41	93	grön	259	24,1	14	98	79
Hulda	Bor	2003	I-III/e	101	1103	114	101	..	740	43	82	grön	259	24,6	..	99	..
Loviisa	Bor	2017	I-III/e	101	1106	119	122	107	792	38	87	gul	249	23,0	23	95	79
Astronaut	Ragt 2n	2017	I-III/e	101	1106	134	127	126	900	37	79	gul	285	23,7	13	95	78
Ingrid	SW Lantm.	2013	I-III/e	101	1116	117	129	120	843	30	94	gul	325	23,3	13	96	77
Sisu	Bor	2016	I-III/e	102	1108	122	124	106	771	32	89	grön	282	22,2	22	94	81
Blueman	Ragt 2n	2019	I-III/e	102	1124	127	130	114	841	30	94	grön	325	23,3	13	95	77
Matilda	Bor	2017	I-III/e	102	1113	140	126	107	839	46	90	grön	250	23,0	23	97	84
Greenway	NS	2020	I-III/e	102	1130	128	136	141	948	43	90	grön	305	23,8	13	91	77
Bagoo	KWS	2020	I-III/e	103	1135	134	139	130	897	47	103	gul	260	22,8	16	91	79

*)Mognad: Andelen mjuka ärter efter 60 minuters kokning.