

## HÖSTRYBS OCH -RAPS i de officiella sortförsöken 2016–2023. Sorterna i tidighetsordning.

| Sort                         | Förädlare | Till<br>sortlistan | Växttid | Avkastning på olika<br>odlingszoner |          | Stjälk-<br>längd | Liggsä-<br>d | TkV | Protein | Protein-<br>skörd | Olje <sup>1)</sup> | Olje-<br>skörd | Vinter-<br>utfällning | Kloro-<br>fyll |
|------------------------------|-----------|--------------------|---------|-------------------------------------|----------|------------------|--------------|-----|---------|-------------------|--------------------|----------------|-----------------------|----------------|
|                              |           |                    |         | I                                   | II       |                  |              |     |         |                   |                    |                |                       |                |
| <b>Legato</b> <sup>2)</sup>  | ECRI      | 2017               | 340     | 61                                  | 69       | 121              | 7            | 3,0 | 25,1    | 489               | 39,0               | 785            | 25                    | 7              |
| <b>PR44D06</b> <sup>3)</sup> | Pioneer   | 2015               | 356     | 2896=100                            | 1833=100 | 102              | 0            | 5,5 | 21,6    | 589               | 42,3               | 1193           | 40                    | 9              |
| <b>Thure</b> <sup>3)</sup>   | NPZ       | 2016               | 358     | 92                                  | 95       | 109              | 0            | 6,5 | 22,8    | 532               | 40,3               | 1015           | 36                    | 15             |

<sup>1)</sup> Vid 9 % fuktighet.

<sup>2)</sup> Höstrybs

<sup>3)</sup> Halvdvärgartad sort.