

Höstrågssorterna

Höstrågssorterna i de officiella sortförsöken 2014–2021. Försökens mätarsort var Dankowskie Agat.

Sort	Förädlare	I sort-förteckningen	Rekommenderad odlingszon	Växttid dygn	Effektiv värmesumma	Strållängd cm	Liggsäd %	TKV g	HLV kg	Protein %	Falltal vid skörd	Avkastning på olika odlingszoner			Vinterutfällning, %	Växtsjukdomar, %		
												I	II	III		Brunrost	Snömögel	Bladfl.sjukdomar totalt
Reflektor	P.H.Petersen	2022	I–III	337	901	132	29	33,4	75,1	10	184	108	104	99	14,2	4,6	8,5	21
Dankowskie Turkus	Danko	2020	I–III	337	906	128	7	35,9	74,9	11	210	106	99	100	12,1	0,3	7,1	16,8
Dankowskie Agat	Danko	2015	I–III	337	909	128	28	34,4	73,8	10	184	6637=100	6411=100	6877=100	13,9	5,9	9,8	25
Dankowskie Granat	Danko	2020	I–III	337	910	127	9	34,8	75	11	215	112	97	105	14	1,3	5,8	18,5
SU Cossani ^{H)}	Hybro	2019	I–III	337	910	118	5	35,6	75,1	10	223	114	115	115	8,2	16,6	4,7	23,1
Reetta	Bor	2009	I–III	337	910	140	28	30,2	74,8	11	186	92	100	101	9,3	21,1	4,9	22
SU Pluralis ^{H)}	Hybro		I–III	338	917	121	23	34,4	74,4	9	186	121	127	126	13,9	4,3	4,5	16
SU Performer ^{H)}	Hybro	2017	I–III	338	920	119	22	35,5	75,4	9	245	125	115	122	12,4	3,3	4,8	18,7
KWS Binntto ^{H)}	KWS	2018	I–III	338	920	113	14	35,5	72,6	10	222	130	113	117	12,8	5,5	5,2	16
KWS Trebiano ^{H)}	KWS		I–III	338	922	126	17	37	75,2	9	223	130	127	134	9,3	0,9	3,9	14,7
KWS Jethro ^{H)}	KWS		I–III	339	924	126	18	37,1	74,7	10	259	142	146	150	13,4	..	5,2	15,1
KWS Serafino ^{H)}	KWS		I–III	339	926	122	30	34,5	74,4	9	256	126	129	132	12,3	4,9	2,7	18,6
KWS Tayo ^{H)}	KWS		I–III	339	929	120	18	35,5	74	10	260	131	141	145	9,9	3,6	5,8	16,6
KWS Livado ^{H)}	KWS	2018	I–III	339	928	120	25	33,8	74,7	10	216	122	117	117	13,4	1,8	3,7	15
KWS Receptor ^{H)}	KWS		I–III	339	932	121	44	32,5	74,5	9	247	119	140	137	12,3	4,7	4,6	15,4
KWS Detektor ^{H)}	KWS		I–III	339	935	121	27	33,4	74,4	9	264	123	137	141	12	5,2	6,6	16,1
KWS Vinetto ^{H)}	KWS		I–III	339	933	119	16	35,4	74,7	10	247	125	129	131	13,1	5,5	3,5	18,5

H)= hybridsort